



## 為什麼會發生這種情況？

有阿茲海默症或失智症的人可能會：

- 忘記服用藥物
- 忘記他們已經服用了藥物，而一次又一次地服用
- 因為服用錯誤或過量藥而導致生病或中毒



844.HELP.ALZ  
AlzheimersLA.org

© 2019 Alzheimer's Los Angeles  
Supported by DHHS, ACL (#90ADPI0024-01-00)  
Traditional Chinese

有阿茲海默症 (疾病) 或失智症 (症狀) 的人可能需要他人協助準備他們的藥物。以免因服用過多、過少或者不按指示而構成危險。

## 您可以做些什麼？

### 密切觀察

- 確保受照顧者：
  - 在正確的時間服用適當數量的藥丸
  - 遵循藥物的指示
- 不要將藥物放在他/她容易拿到的地方
- 不要讓他/她單獨服藥

### 鎖好藥物

- 確保所有藥物都在受照顧者的視線範圍之外和不可觸及之處

### 與所有的醫生交談

- 在沒有詢問開處方的醫生之前，不要停止給藥
- 每次見醫生時用袋子或盒子攜帶所有藥物
  - 包括維生素，草藥，茶，藥膏和非處方的藥物
- 詢問醫生藥物是否可以混入食物或飲料
  - 如果可以的話，就能幫助您的受照顧者服藥

**注意：**如果您發現突然出現的變化，如暴力行為或大小便失禁，請盡快聯繫醫生

- 這些變化可能是由於藥物或新疾病反應所致