

## Заболевания, дающие право на участие с учетом возраста и имеющихся оснований

Все состояния инвалидности должны возникать до достижения 18-летнего возраста, продолжаться неопределенно долго и приводить к существенному ограничению адаптивного функционирования согласно WAC 388-823.

Заболевания, дающие право на участие с учетом возраста			
Заболевание	0 - 3	4 - 19	20 и выше
Задержки в развитии	X	X	
Intellectual Disability (отставание в умственном развитии, ID)		X	X
Церебральный паралич		X	X
Эпилепсия		X	X
Аутизм		X	X
Иное неврологическое или другое состояние, аналогичное умственной отсталости.		X	X

Виды тестирования, результаты которого принимаются как подтверждение существенных ограничений в развитии	
Когнитивные тесты	Адаптивные оценки
<ul style="list-style-type: none"> <li>• по шкале Стэнфорд-Бине</li> <li>• Wechsler Intelligence Scales (Интеллектуальная шкала Векслера, WISC)</li> <li>• Differential Abilities Scale (Дифференцированная шкала способностей, DAS)</li> <li>• Kaufman Assessment Battery for Children (Батарея тестов Кауфмана для детей, К-АВС)</li> <li>• Das-Naglieri Cognitive Assessment System (Когнитивная система оценки Дас-Наглиери, CAS)</li> <li>• Woodcock Johnson Test of Cognitive Abilities (Тесты когнитивных способностей Вудкока-Джонсона, WJ)</li> <li>• Reynolds Intellectual Assessment Scales, 2nd Edition (Шкалы интеллектуальной оценки Рейнольдса, 2-е издание, RIAS 2)</li> </ul> <p>Если у вас имеется нарушение слуха, английский не является вашим основным языком или вы не разговариваете, ваш FSIQ можно оценить с помощью одного из тестов ниже:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leiter International Performance Scale-Revised (Пересмотренная международная шкала продуктивности Лейтера, Leiter-R)</li> <li>• Wechsler Intelligence Scales (Интеллектуальные шкалы Векслера, WISC, WAIS, WNV)</li> <li>• Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (Комплексный тест на невербальный интеллект, C-TONI)</li> <li>• Kaufman Assessment Battery for Children (Батарея тестов Кауфмана для детей, К-АВС) Индекс невербальной шкалы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vineland Adaptive Behavior Scales (Шкала адаптивного поведения Вайнленда, VABS)</li> <li>• Scales of Independent Behavior-Revised (Пересмотренные шкалы независимого поведения, SIB-R)</li> <li>• Inventory for Client and Agency Planning (Инвентаризация для планирования работы с клиентами и агентствами, ICAP)</li> <li>• Adaptive Behavior Assessment System (Система оценки адаптивного поведения, ABAS)</li> </ul>

Диагноз, диагност и необходимые свидетельства существенных ограничений в развитии		
Диагноз	Диагност	Существенные ограничения
Задержка в развитии	Неприменимо	Задержки в развитии
Задержка умственного развития	Лицензированный психолог или сертифицированный школьный психолог	Оценка адаптивного функционирования со стандартным баллом $\leq 69$ и Психологическая оценка с FSIQ $\leq 69$ или по шкале Стэнфорд-Бине IV с FSIQ $\leq 67$
Церебральный паралич, или Аналогичное повреждение головного мозга, вызывающее квадриплегию, гемиплегию или диплегию.	Лицензированный врач	Начало заболевания в возрасте до 3 лет и Свидетельства необходимости непосредственной физической помощи в любых двух из следующих случаев: пользование туалетом, принятие ванны, прием пищи, одевание, передвижение или общение.
Эпилепсия, припадочное расстройство	Невропатолог, получивший профессиональную сертификацию	Приступы носят неконтролируемый характер, продолжаются или повторяются, и Оценка адаптивного функционирования со стандартным баллом $\leq 69$
Аутизм, аутистическое расстройство (DSM-IV-TR-299.00) или Расстройство аутистического спектра (DSM-5)	Сертифицированный невролог; сертифицированный психиатр; лицензированный психолог; сертифицированный проф. советом педиатр по развитию и поведению; лицензированный врач или дипломированная практикующая медсестра высшей квалификации ARNP, связанные с центром лечения аутизма, центром развития или центром передового опыта	Свидетельства начала заболевания в возрасте до 5 лет, оценка адаптивного функционирования со стандартным баллом $\leq 69$ и для диагноза DSM-5 FSIQ $\leq 84$ (или письменное заявление о том, что аутизм не позволяет пройти тестирование)
Иное неврологическое или другое состояние, аналогичное умственной отсталости.	Лицензированный врач	Оценка адаптивного функционирования со стандартным баллом $\leq 69$ и FSIQ $\leq 77$ или по шкале Стэнфорд-Бине IV с FSIQ $\leq 75$ , или, если возраст меньше 20 лет, баллы по общему чтению и общей математике $\leq 69$ могут быть заменой тестирование FSIQ.